

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: CIRUELO

Victoria

Tamaño: Mediano o grande.

Forma: Elíptica o elíptica alargada. Bastante regular.

Zona pistilar: Redondeada. **Punto pistilar:** Muy pequeño, amarillento o grisáceo. Superficial. Prácticamente centrado.

Sutura: Fina línea morada como transparente, bien visible por estar situada en una estrecha franja más clara que el resto del fruto por estar libre de punteado. Hundida junto a la cavidad peduncular, en ligera depresión en la zona ventral central y completamente superficial en el polo pistilar.

Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, poco profunda. Poco rebajada en la sutura y mas bien un poco levantada en el lado opuesto. **Pedúnculo:** Longitud media, finos, leñosos, muy pubescentes.

Piel: Fuerte y ácida. Con abundante pruina violácea clara. No se aprecia pubescencia. **Color:** Rojo púrpura claro, uniforme a no ser por el punteado que lo oscurece. Punteado abundante, pequeño o mediano, dejando libre la zona peduncular y zona de sutura, blanquecino con aureola muy perceptible de color granate más oscuro que el color general del fruto.

Carne: Amarillo ámbar. Firme, pastosa, poco jugosa. **Sabor:** Agradable, excepto junto a la piel que es muy ácida.

Hueso: Libre o semi-libre. Grande, elíptico, muy aplastado. Zona ventral muy estrecha pero bien marcada. Surcos bien marcados sobre todo el dorsal. Superficie arenosa.

Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

